

推奨抗菌薬リスト卓上版（2024年9月1日 歯薬協働 作成、2024年12月10日 歯薬協働 補正）

推 奨 薬	1. 成人用（比較的軽度な感染症の場合）	2. 成人用（重度感染症の場合）	3. 小児用
	アモキシシリン（125・250mg・10%細粒・20%細粒） 250mg/回 1日3～4回投与	セフカペンピボキシル（75・100mg・10%小児用顆粒） 100mg/回 1日3回投与	アモキシシリン（125・250mg・10%細粒・20%細粒） 20～40mg/kg/日 分3～4回投与 最大90mg/kg/日を超えない
	アジスロマイシン（250・600mg） 500mg/回 1日1回3日間投与	シタフロキサシン（100mg） 50mg/回 1日2回投与又は100mg/回 1日1回投与	セフカペンピボキシル（75・100mg・10%小児用顆粒） 3mg/kg/回 1日3回投与
クラリスロマイシン（200mg） 400mg/日 分2回投与	セフジトレンピボキシル（100mg・10%小児用顆粒） 100mg/回 1日3回投与 重症時は1回200mgまで増量可	セフジトレンピボキシル（同左） 3mg/kg/回 1日3回投与（200mg/回を超えない）	
オ プ シ ョ ン	（※）セフェム系経口抗菌薬が出荷調整などで使用できない時の代替品		
	アモキシシリン/クラブラン酸カリウムの配合剤（AMPC/CVA）（125SS/250RS）		
	AMPCとして250mg/回 1日3～4回 毎6～8h投与		【1～3ヶ月未満】AMPCとして30mg/kg/日 毎12h投与 【3ヶ月以上】20～40mg/kg/日 8h毎又は25～45mg/kg/日 毎12h分割投与（1日2回投与の方が下痢発症少） 【体重40kg以上】成人量使用
	スルタミシリン（375mg・10%小児用細粒）		
	375mg/回 1日3～4回投与		15～30mg/kg/日 分3回投与
	トスフロキサシン（60・75・150mg・15%小児用細粒） 300～450mg/日 分2～3回投与、重症600mg/日		クラリスロマイシン 10～15mg/kg/日（上限400mg/日） 分2～3回投与
	ファロペネム（150・200mg・10%小児用DS）		
	150～200mg/回 1日3回投与		5～10mg/kg/回（用時溶解）300mg/回を上限
ミノサイクリン（50・100mg・2%顆粒）			
100～200mg/初回 以後12あるいは24hごと100mg/回投与。 適応は歯周組織炎・歯冠周囲炎・上顎洞炎・顎炎（顆粒は除く）			